BILANS SEDIMENTAIRES DE L'ESTUAIRE DE LA GIRONDE 1953 - 2005

L'objectif de cette séance est de calculer des bilans sédimentaires à partir de données bathymétriques de l'estuaire.

Données nécessaires à la séance

Exercice 1 : Élaboration de cartes bathymétriques de l'estuaire

Données nécessaires

Rasters : **nat_1953, 1962, 1970, 1980, 1994, 2000, 2005**

Shapes : **TraitCoteGironde**

Effectuez une série de cartes bathymétriques de l'estuaire de la Gironde. Afin de rendre comparable les différentes cartes vous devez utiliser pour chaque année la même symbologie. Pour cela :

1. Pour l'année 2005 appliquez une symbologie en mode “Classé” avec un “Intervalle défini” de 1m.
2. Pour les autres années importez la symbologie de l'année 2005.
3. Dans le mode mise en page produisez 7 cartes avec la bathymétrique et le trait de côte de l'estuaire. Exporter chaque carte au format png. Pensez à créer un géosignet afin de fixer l'étendue de vos cartes.
4. Insérez les 7 cartes dans une page Powerpoint.

Exercice 2 : Calcul des différences entre les levés bathymétriques

Afin de visualiser les évolutions entre les différents levés, effectuez des soustractions sur les rasters par couples d'années (1953-1962, 1962-1970, 1970-1980, 1980-1994, 1994-2000, 2000-2005). Pour cela utilisez l'outil “Soustraction” (Outils Spatial Analyst - Mathématiques).

Pour mettre en évidence les zones en érosion et en sédimentation utilisez la symbologie suivante :



En mode mise en page exportez les 6 cartes de différences et insérez les dans Powerpoint.

Exercice 3: Calcul des surfaces des étages bathymétriques par tranche de 1 m

A partir des rasters **nat_1953, 1962, 1970, 1980, 1994, 2000, 2005** :

1. Transformer les rasters en entiers avec l'outil “Entier”
2. Convertir les rasters en polygones avec l'outil “Raster vers polygone”
3. Agréger tous les polygones de même valeur bathymétrique avec l'outil “fusionner - Gestion des données”. La fusion doit être faite par rapport aux valeurs bathymétriques (gridcode).
4. Dans la table attributaire du shape précédemment crée rajouter un champ surface et calculez-la en km² (“calculer la géométrie”)
5. Exporter les tables attributaires vers Excel avec l'outil “Table vers Excel”
6. Sous excel calculez réalisez un graph présentant les surfaces des étages bathymétriques par tranche de 1 m.


Exercice 4: Calcul des bilans érosion - sédimentation

A partir des rasters **nat_1953, 1962, 1970, 1980, 1994, 2000, 2005**, évaluez les bilans érosion-sédimentation pour les couples d'années 1953-1962, 1962-1970, 1970-1980, 1980-1994, 1994-2000 et 2000-2005.

L'outil “Volumes” (Outils 3D Analyst - Volume) permet de calculer le volume d'un raster au dessus d'une surface donnée.

Mettez une hauteur du plan de référence bien en dessous des valeurs bathymétriques de l'estuaire (-100 m). Pour calculer les bilans vous allez calculer des différences donc la position du plan de référence ne va pas influencer le résultat.

Pour aller plus vite vous pouvez utiliser le traitement par lots de l'outil (click droit sur l'outil).



Finissez les calculs sous Excel et faites un graph (histogramme) présentant le bilan sédimentaire de l'estuaire depuis 1953.

Exercice 5: calculs des bilans sédimentaires entre les PK 0 et 96

Chargez le shape PK. Il s'agit des points kilométriques mesurés à partir du pont de pierre de Bordeaux.

A partir des différentiels **1953-1962, 1962-1970, 1970-1980, 1980-1994, 1994-2000, 2000-2005** tracez des sections tout les 10 km. Partagez vous le travail !!!

Pour cela utilisez l'outil “Interpoler une ligne” de la barre d'outils “3D analyst”, puis “diagramme de profil” et “exporter - Données - Texte”

Sous Excel, calculez un bilan pour chaque section puis tracez une courbe correspondant aux bilans sédimentaires entre les PK 0 et 96.

From:
http://www.geocean.net/wikisig/ -

Permanent link:
http://www.geocean.net/wikisig/doku.php?id=gironde:start&rev=1415266383

Last update: **2014/11/06 09:33**